

①コース 定期のみ

(ア) 2ヶ月 ①ヒブ + ①肺炎球菌 + ①B肝
 ↓ 4週間あけて3ヶ月になったら
 (イ) 3ヶ月 ②ヒブ + ②肺炎球菌 + ①4混 + ②B肝
 ↓ 4週間あけて
 (ウ) 4ヶ月 ③ヒブ + ③肺炎球菌 + ②4混
 ↓ 3週間あけて
 (エ) 5ヶ月 BCG + ③4混
 ↓ B肝1回目より139日以上あけて
 (20~24wの間)
 (オ) 7ヶ月ごろ ③B肝

②コース 任意込み (5種類コース)

(ア) 2ヶ月 ①ヒブ + ①肺炎球菌 + ①ロタ + ①B肝
 ↓ 4週間あけて3ヶ月になったら
 (イ) 3ヶ月 ②ヒブ + ②肺炎球菌 + ②ロタ + ②B肝 + ①4混
 ↓ 4週間あけて
 (ウ) 4ヶ月 ③ヒブ + ③肺炎球菌 + ②4混
 ↓ 3週間あけて
 (エ) 5ヶ月 ③4混 + BCG
 ↓ B肝1回目より139日以上あけて
 (20~24wの間)
 (オ) 7ヶ月ごろ ③B肝

③コース

(ア) 2ヶ月 ①ヒブ + ①肺炎球菌
 ↓ 1週間あけて
 (イ) ①B肝 + ①ロタ
 ↓ 4週間あけて3ヶ月になったら
 (ウ) 3ヶ月 ②ヒブ + ②肺炎球菌 + ①4混
 ↓ 1週間あけて
 (エ) ②B肝 + ②ロタ
 ↓ 4週間あけて
 (オ) 4ヶ月 ③ヒブ + ③肺炎球菌 + ②4混
 ↓ 3週間あけて
 (カ) 5ヶ月 ③4混 + BCG
 ↓ B肝1回目より139日以上あけて
 (20~24wの間)
 (キ) 7ヶ月ごろ ③B肝

④コース

(ア) 2ヶ月 ①B肝 + ①ロタ
 ↓ 4週間あけて3ヶ月になったら
 (イ) 3ヶ月 ①ヒブ + ①肺炎球菌 + ①4混
 ↓ 1週間あけて
 (ウ) ②B肝 + ②ロタ
 ↓ 4週間あけて
 (エ) 4ヶ月 ②ヒブ + ③肺炎球菌 + ②4混
 ↓ 4週間あけて
 (オ) 5ヶ月 ③ヒブ + ③肺炎球菌 + ③4混 + BCG
 ↓ B肝1回目より139日以上あけて
 (20~24wの間)
 (カ) 7ヶ月ごろ ③B肝

⑤コース (3Mスタート ロタこみ)	⑥コース
(ア) 3ヶ月 ①ヒブ + ①肺炎球菌 + ①B肝 + ①4混 + ①ロタ (15w以内) ↓ 4週間あけて	(ア) 3ヶ月 ①ヒブ + ①肺炎球菌 + ①4混 + ①B肝 ↓ 4週間あけて
(イ) 4ヶ月 ②ヒブ + ②肺炎球菌 + ②B肝 + ②4混 + ②ロタ (24w以内) ↓ 4週間あけて	(イ) 4ヶ月 ②ヒブ + ②肺炎球菌 + ②4混 + ②B肝 ↓ 4週間あけて
(ウ) 5ヶ月 ③ヒブ + ③肺炎球菌 + ③4混 ↓ 1週間あけて	(ウ) 5ヶ月 ③ヒブ + ③肺炎球菌 + ③4混 ↓ 1週間あけて
(エ) BCG ↓ B肝1回目より139日以上あけて (20~24wの間)	(エ) BCG ↓ B肝1回目より139日以上あけて (20~24wの間)
(オ) 8ヶ月ごろ ③B肝	(オ) 8ヶ月ごろ ③B肝
用語説明	
ヒブ	ヒブワクチン
肺炎球菌	小児肺炎球菌ワクチン「プレベナー」
4混	四種混合ワクチン
ロタ	ロタリックス
B肝	B型肝炎